

Agaricus praeclaresquamosus



Classe: Basidiomiceti
Nome scientifico: Agaricus praeclaresquamosus
Sinonimo: Agaricus meleagris

Capello: prima semiglodato o a campana, spesso nella parte centrale, poi aperti, a volte umbonato, 5-12 cm; bruno scuro quasi nerastro al centro, coperto da scaglie delicate e fini su fondo biancastro, più rade verso il margine.

Lamelle: fitte, abbastanza larghe, prima chiare, poi rosa e infine bruno-nerastre. Margine denticolato e pallido.

Gambo: cilindrico bulboso alla base, 6-10 x 1,1-1,2 cm, cavo; di colore bianco che si macchia di giallo zafferano al tatto specialmente alla base; anello portato alto, cascante, bianco ma giallo al tocco, macchiato bruno porpora come il gambo, sopra rigato e sotto ornato da zona denticolata, giallastra.

Carne: bianca, giallo zafferano alla base del gambo.
Odore: sgradevole di sudore, farina fresca, inchiostro.
Spore: bruno chiare, ovali buttulate, basidi con 4 spore.

Fungo saprofito. Si trova in gruppi nei terreni umidi, nell'erba dei boschi cedui di latifoglie, da giugno a settembre.

Tossico