

Leccinum lepidum



Classe: Basidiomiceti

Nome scientifico: *Leccinum lepidum* (Bouchet ex Ess.) Bon & Contu

Sinonimi: *Boletus lepidus* Bouchet

Nome comune: Leccino

Cappello: 5-15 cm, carnosio, sodo poi molle, inizialmente emisferico, poi convesso persistente, mai piano. Margine spesso eccedente, involuto da giovane. Cuticola rugosa, vischiosa ad umido, liscia a secco, mai vellutata screpolata. Colore variabile da giallo limone, giallo bruno a bruno scuro.

Tubuli: arrotondati al gambo, molto lunghi, giallo limone.

Pori: rotondi, piccoli, concolori ai tubuli; assomono leggera colorazione nerastra con l'età.

Gambo: 6-12 x 2-4 cm, cilindrico ingrossato alla base, o sinuoso. Pieno, fibroso, con rugosità longitudinali. Giallo citrino, poi giallo scuro, bruno rossastro al tocco, alla base brunastro. Cosperso da fini squamette concolori, poi imbrunenti.

Carne: soda ma presto molle, fibrosa nel gambo, bianca-giallognola, al taglio vira lentamente al rosa-rossastro, poi decolora al grigio-ocra. Odore debole, gradevole, sapore dolce.

Spore: bruno tabacco in massa, lisce o fusiformi.

Fungo simbiote.

Cresce in quasi tutti i mesi dell'anno, in gruppi di diversi esemplari, presso lecci e sughere.

Buona commestibilità