

# Lyophyllum decastes



Classe: Basidiomiceti

Nome scientifico:

Sinonimi: Agaricus aggregatus Schaeff. - Agaricus decastes Fr. - Lyophyllum aggregatum (Schaeffer) Kuhn

Nomi volgari: Agarico aggregato - Agarico conglobato - Castagnin - Castagneu

Cappello: 5-7 cm, prima emisferico-convesso, poi aperto, con il margine involuto, con o senza umbone, ondulato e/o lobato, con la cuticola liscia o fibrillosa in senso radiale, brillante e lardacea con l'umidità, poco spessa, di colore bruno grigio, bruno-ocra, fino a bruno scuro, con il margine più chiaro, anche quasi del tutto bianco.

Lamelle: adnate, mediamente fitte, con lamellule, di colore bianco-ocra-grigiastro con sfumature rosa.

Gambo: 3-10 cm, pieno, elastico e fibroso, biancastro, un po' incurvato alla base.

Carne: abbastanza elastica, biancastra, con un gradevole odore e sapore fungino o di farina.

Spore: 5,5-7 Å — 5,0-6,5 Åµm, subglobose, lisce, ialine.

Fungo saprofito.

Cresce generalmente in gruppi, nelle zone aperte dei boschi, sia di conifere che di latifoglie

Buona commestibilità