

Phaeolepiota aurea



Classe: Basidiomiceti

Nome scientifico: *Phaeolepiota aurea* (Matt.: Fr.) Mre.

Sinonimi: *Pholiota aurea* - *Lepiota pyrenaea* - *Cystoderma aureum*

Nome comune: Fungo dei Pirenei

Cappello: 5-15 cm, carnoso, prima quasi globoso e chiuso, poi aperto, leggermente umbonato, giallo-ocraceo-dorato, dapprima pulverulento per piccole squamette assai dense, poi vellutato e più scuro.

Lamelle: ocracee poi ferruginose, fitte, arrotondate verso il gambo.

Gambo: 8-15 cm x 1,3-3,5 cm, robusto, quasi cilindrico, pieno che diventa molle, biancastro sopra l'anello, al di sotto ocraceo marcato e tomentoso farinoso; anello ampio, ascendente, permanente, formato dall'allungamento del velo che inguaina gran parte del gambo e che è facilmente distaccabile sino al piede.

Carne: soda, biancastra, all'aria giallognola, rossastra verso il piede, forte odore aromatico e deciso sapore (non a tutti gradevole).

Spore: ocraceo-dorate.

Fungo saprofito.

Si trova in gruppi, a volte con gambi concresciuti, tra il muschio, le ortiche, nelle radure dei boschi di abeti e faggio, ma anche sui mucchi di segatura. Fine estate-autunno.

Commestibile