

Arrhenia lobata



Classe: Basidiomiceti

Nome scientifico: *Arrhenia lobata* (Pers.: Fr.) Kühn. & Lamoure ex Redh.

Sinonimi: *Merulius lobatus* Pers. 1801

Cantharellus lobatus (Pers.) Fries 1821

Corniola lobata (Pers.) 1821

Leptotus lobatus (Pers.) Karst. 1879

Dyckia lobata (Pers.) Quellet 1900

Leptoglossum lobatum (Pers.) Ricken 1915

Cappello: 1-5 cm. Sottile, pruinoso, spatuliforme, glabro; i bordi del lobo sono scuri; il resto della superficie del fungo assume diverse tonalità che vanno dal caffelatte al grigio bruno; quando il carpoforo è intriso d'acqua, la superficie lascia intravedere, per trasparenza, alcune venature anastomosate che la percorrono fino alla base.

Lamelle: venose, abbastanza anastomizzate, rigonfie, concolori al cappello.

Gambo: corto, laterale, concolore, villosa alla base.

Carne: esigua, biancastra, inodore e insapore.

Spore: ovoidali allungate.

Fungo saprofito.

Aderente ai muschi, in luoghi molto umidi, spesso vicini a ruscelli.

Commestibilità: senza valore.

Commestibile